

食道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	備考
術前FP (800/80)	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	術前化学療法
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～5		
術前DCF	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1	2 1 日	術前化学療法
	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	750 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～5		
FP(700/70) +RT	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 8 日	放射線併用 Day1～4,29～ 32にケモを行う
	フルオロウラシル	700 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～4		
FP (800/80)	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 8 日	化学療法単独
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～5		
DTX	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1	2 1 日	
Weekly PTX	パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1,8,15, 22,29,36	5 6 日	6 投 2 休
Nivo 2W	ニボルマブ	240 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	1 4 日	1 年間のみ
Nivo 4W	ニボルマブ	480 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 8 日	1 年間のみ

FOLFOX+RT	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	放射線併用 6サイクル
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1		
	フルオロウラシル	1600 mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	放射線併用後
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
Nivo 2W+Ipi	ニボルマブ	240 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1,15,29	4 2 日	
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注 3 0 分	Day1		
Nivo 3W+Ipi	ニボルマブ	360 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1,22	4 2 日	
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注 3 0 分	Day1		
Nivo+FP(800/80)	ニボルマブ	480 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 8 日	
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1~5		

Pembro+FP(800/80)	ペムブロリズマブ	200 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 1 日	
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～5		
Pembro+5-FU	ペムブロリズマブ	200 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 1 日	
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注 2 4 時間	Day1～5		
Pembro 3W	ペムブロリズマブ	200 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 1 日	
Pembro 6W	ペムブロリズマブ	400 mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 1 日	