

大腸癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
5FU+LV	レボホリナート	250mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	7 日	Roswell Park Regimen 6 投 2 休
	フルオロウラシル	600mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
FOLFOXIRI	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1	1 4 日	BRAF陽性
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	4 6 時間	Day1		

mFOLFOX6 +Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 60分 (初回120分 2回目90分)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	Day1		
SOX + Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 60分 (初回120分 2回目90分)	Day1,15	28日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1,15		
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		
CAPOX +Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 60分 (初回120分 2回目90分)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2×	Day1~7		
mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	Day1		

CAPOX+BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
Cape+BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	21日	
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
SOX+BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
FOLFOXIRI+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	14日	BRAF陽性
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 60分	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	Day1		
ロンサーフ+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1,15	28日	
	ロンサーフ	70mg/m ²	内服 2 ×	Day1~5,8~12		

CET	セツキシマブ	250mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 6 0 分 (初回 1 2 0 分)	Day1	7 日	
mFOLFOX6+CET	セツキシマブ	250mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 6 0 分 (初回 1 2 0 分)	Day1,8	1 4 日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
ENCO+BINI +CET	セツキシマブ	250mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 6 0 分 (初回 1 2 0 分)	Day1	7 日	BRAF陽性
	ビラフトビ	300m g	内服 1 ×	Day1～7		
	メクトビ	90m g	内服 2 ×	Day1～7		
PER+TRA	ペルスツズマブ	420mg/Body (初回840mg/Body)	点滴静注 3 0 分 (初回 6 0 分)	Day1	2 1 日	HER2陽性
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 3 0 分 (初回 9 0 分)	Day1		
CAPOX+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 3 0 分 (初回 6 0 分)	Day1	2 1 日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1～14		

mFOLFOX6+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 46時間	Day1		
SOX+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		
PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	Day1	14日	
S1 + MMC + RT	マイトマイシン	10mg/m ²	点滴静注全開	Day1	28日	
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		
5FU+CDDP+RT	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注 120分	Day1	28日	肛門管癌 放射線併用 Day1~4, 29~
	フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注 24時間	Day1~4		
減感作SOX + BEV	ベバシズマブ	7.5mg/m ²	点滴静注 60分	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1		
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		

FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1	1 4 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
SIR	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1	2 1 日	
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
IRIS	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,15	2 8 日	
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
FOLFIRI+AFL	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注 6 0 分	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
CPT11 + Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 6 0 分 (初回120分 2回目90分)	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		

FOLFIRI + Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 6 0 分 (初回120分 2回目90)	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
IRIS + Biweekly-CET	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注 6 0 分 (初回120分 2回目90)	Day1,15	2 8 日	
	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,15		
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
TEGAFIRI + BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60)	Day1,15	2 8 日	
	イリノテカン	120mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,15		
	UFT	300mg/m ² /day	内服2×~3×	Day1~21		
	ユーゼル	75mg/Body	内服3×	Day1~21		
FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60)	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		

IRIS+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1,15	28日	
	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注90分	Day1,15		
	S1	80~120mg/day	内服2×	Day1~14		
SIR+BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	21日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注90分	Day1		
	S1	80~120mg/day	内服2×	Day1~14		
CAPIRI+BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注30分 (初回90分 2回目60分)	Day1	21日	
	イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注90分	Day1		
	カペシタビン	1600mg/m ²	内服2×	Day1~14		
FOLFIRI+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注30分 (初回60分)	Day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注90分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注46時間	Day1		
IRIS+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注30分 (初回60分)	Day1,15	28日	
	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注90分	Day1,15		
	S1	80~120mg/day	内服2×	Day1~14		

CPT11+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 3 0 分 (初回 6 0 分)	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		
FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 3 0 分 (初回 6 0 分)	Day1	1 4 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注全開	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		